

FICHA TÉCNICA - VACUNA OLEOVAC HCI NW LT CORIZA PLUS+®



Nº REGISTRO SENASA: B.01.A.01.N.1213

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

OLEOVAC HCI NW LT CORIZA PLUS+® es una vacuna inactivada/oleosa para aves.

PRESENTACION:

Frascos de 0.5 L

COMPOSICION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA:

Sustancia activa:	Adenovirus aviar grupo I-serotipo 4, 8 y 11; Virus de Newcastle cepa La Sota, Virus de Laringotraqueítis Aviar cepa CEO y <i>Avibacterium paragallinarum</i> serotipo A, B y C.
Cada dosis contiene:	• Virus de Hepatitis a cuerpos de inclusión; Adenovirus Aviar, grupo I-serotipo 4, con un título de $\geq 4 \times 10^{8.0}$ TCID50%: 0.04 ml. • Virus de Hepatitis a cuerpos de inclusión; Adenovirus Aviar, grupo I-serotipo 8, con un título de $\geq 4 \times 10^{8.0}$ TCID50%: 0.03 ml • Virus de Hepatitis a cuerpos de inclusión; Adenovirus Aviar, grupo I-serotipo 11, con un título de $\geq 4 \times 10^{8.0}$ TCID50%: 0.04 ml • Virus de Newcastle, cepa La Sota: con un título de $\geq 4 \times 10^{8.0}$ TCID50%: 0.04 ml. • Virus de Laringotraqueítis Aviar, cepa CEO: con un título de $\geq 4 \times 10^{8.0}$ TCID50%: 0.04 ml. • Suspensión de <i>Avibacterium paragallinarum</i>, Serotipo A: con un título de $\geq 4 \times 10^{8.0}$ UFC: 0.0264 ml. • Suspensión de <i>Avibacterium paragallinarum</i>, Serotipo B: con un título de $\geq 4 \times 10^{8.0}$ UFC: 0.0268 ml. • Suspensión de <i>Avibacterium paragallinarum</i>, Serotipo C: con un título de $\geq 4 \times 10^{8.0}$ UFC: 0.0268 ml.
Excipiente(s):	No presenta.
Adyuvantes:	Aceite mineral, Span 80, Tween 80

FORMA FARMACEUTICA:

Suspensión oleosa.

INDICACIONES DE USO:

Protección:

Ayuda en la prevención de las enfermedades de Hepatitis por cuerpos de Inclusión, Newcastle, Laringotraqueítis Aviar y Coriza Infecciosa.

Precauciones para su uso en animales:

- Solo deben inmunizarse animales sanos.
- Antes de su uso la vacuna se debe estabilizar a temperatura ambiente (25 °C), y agitar fuertemente antes de aplicar.
- En el caso de vacunaciones múltiples (vivas e inactivadas en el mismo día) los componentes de las vacunas inactivadas pueden inactivar las vacunas vivas por lo que se recomienda vacunar con vacuna viva primero y 2 horas después aplicar vacunas inactivadas.
- Usar instrumental con una adecuada higiene y limpieza

Verificar la dosificación y efectividad de la vacunación (AVE NO VACUNADA, AVE NO INMUNIZADA).

POSOLOGIA / ADMINISTRACIÓN:

Es una vacuna que se aplica por vía sub-cutánea (cuello parte media y posterior) y/ o intramuscular en la parte alta de la pechuga.

PERIODO DE VALIDEZ:

1 año desde la fecha de producción

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN:

- Conservar y transportar refrigerado entre 2°C y 7°C.
- No congelar y proteger de la luz.

TIEMPO DE RETIRO:

No aplica.



Fecha de emisión: Octubre 2024

Revisión: 01

Página: 01 de 01