

NEWCASTLE HEPATITIS 4/8

VACUNA EMULSIONADA

Vacuna para uso veterinario indicada como auxiliar en la prevención de la enfermedad de Newcastle y la Hepatitis con cuerpos de inclusión o Síndrome del hidropericardio serotipos 4 y 8 en aves de corral de un día de edad en adelante.

COMPOSICIÓN:

Contiene una suspensión de virus de Newcastle cepa La Sota y adenovirus del grupo I de la hepatitis con cuerpos de inclusión serotipos 4 y 8, elaborada en embrión de pollo, inactivada químicamente y emulsionada.

INDICACIÓN:

Para ser usada en broilers, ponedoras comerciales y reproductoras.

El programa de vacunación debe ser adecuado a la ubicación, riesgo epidemiológico de la granja, patogenicidad y patotipo de las cepas de campo presentes, según el criterio del Médico Veterinario o el especialista avícola, y debe estar complementado con el uso de vacunas a virus vivos contra la enfermedad de Newcastle.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

0.2 mL en aves de 01 día de edad, vía subcutánea en el tercio medio y posterior del cuello.
0.5 mL en aves de 07 días de edad en adelante, vía intramuscular en la parte alta de la pechuga.

EDAD DE VACUNACIÓN:

POLLO DE ENGORDE:

Aplicar una dosis a partir de 01 día de edad, en aves que saldrán al mercado antes de los 35 días de edad.
Aplicar una revacunación a los 12 días de edad, en aves altamente expuestas al virus o en aves que saldrán al mercado luego de los 35 días de edad.

PONEDORAS COMERCIALES:

Aplicar una dosis de 0.2 ml por ave, a partir de los 19 a 21 días de edad, sobre todo en aves criadas en piso en la etapa del levante.

REPRODUCTORAS:

Aplicar desde los 07 días de edad, al menos dos o tres veces durante el levante, con un intervalo no menor de 04 semanas entre cada aplicación. La última aplicación deberá realizarse 06 semanas antes del inicio de la postura.
Puede revacunarse cuidadosamente alrededor de las 40 semanas de edad de acuerdo al nivel de transmisión de inmunidad materna que se desee conferir a la progenie.

COMPOSICIÓN:

La vacuna debe estar a temperatura ambiente al momento de la aplicación.
Agite el producto enérgicamente antes de su uso y constantemente durante su aplicación.

El manejo de las aves y las parvadas para vacunación debe hacerse con cuidado, tratando de evitar el estrés, asfixia y golpeo en las aves.

No inyecte el producto en la base de la cabeza.

De preferencia no vacune aves en producción, si es necesario aumentar los títulos para transferencia de anticuerpos en reproductoras vacunar con mucho cuidado.

La aplicación de la vacuna debe realizarse con jeringas, agujas y mangueras limpias y esterilizadas.

Para su aplicación, utilice agujas en buen estado del número 21 de ¼ a ½ pulgada de largo.

Cambie las agujas cada 500 a 1,000 aplicaciones.

No guarde vacunas parcialmente utilizadas para aplicaciones posteriores.

Una vez utilizada la vacuna, incinere el envase y el contenido sobrante.

ALMACENAMIENTO:

Conserve la vacuna en refrigeración, entre 2 °C y 7 °C.
Evite la congelación y la exposición directa a los rayos solares.



PRESENTACIÓN:

Frascos de 500 mL

NEWCASTLE HEPATITIS 4/8